

## 追加(3回目)接種に使用するコロナワクチンについてのお知らせ

武田/モデルナ社のワクチンも3回目の接種に使用できるようになりました。

※接種券は、2回目の接種日が早い人から順次発送しています。

接種券が届いてから予約をして接種をしてください。

3回目接種の安全性と効果について、また、よくあるご質問についてお知らせします。なお、詳しくは接種券に同封の説明書をご覧ください。

### ●使用するワクチン

1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。ファイザー社は1・2回目の接種量と同量ですが、**武田/モデルナ社は半量**になります。

### ●3回目接種の安全性と効果

ファイザー社及び武田/モデルナ社の3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後と比べると、どちらのワクチンにおいても、**おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。**

2回目→3回目の接種後の副反応の発現割合	
ファイザー社	武田/モデルナ社
疼痛 (78.3 → 83.0%)	疼痛 (88.3 → 83.8%)
疲労 (59.4 → 63.7%)	疲労 (65.4 → 58.7%)
	頭痛 (58.8 → 55.1%)
頭痛 (54.0 → 48.4%)	筋肉痛 (58.1 → 49.1%)
筋肉痛 (39.3 → 39.1%)	関節痛 (42.9 → 41.3%)
悪寒 (37.8 → 29.1%)	悪寒 (44.3 → 35.3%)
関節痛 (23.8 → 25.3%)	リンパ節症 (14.2 → 20.4%)
38度以上の発熱 (16.4 → 8.7%)	38度以上の発熱 (15.5 → 6.6%)

安全性

効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。



出典：特例承認に係る報告書より

### ●1・2回目と異なるコロナワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果

英国の研究では、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の結果が以下のとおり報告されています。

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容範囲内です。

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチンを受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇しています。

### ●よくあるご質問

❓ 武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

ⓐ 武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。

2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。

(注) 接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。 出典：特例承認に係る報告書より

❓ ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

ⓐ 1・2回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果が維持されています。

ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防の効果が有意に高かったと報告されています。

お問い合わせ先

鏡野町新型コロナウイルス感染症対策本部事務局(保健福祉課内)  
電話(0868)54-2025 FAX(0868)54-2891