

令和7年 こども(定期) 予防接種の実施方法

接種時期: 年間を通じて随時

接種場所: 実施医療機関で個別接種

種類	対象年齢	標準的な接種(開始)時期	接種回数および間隔		備考
ロタウイルス	【ロタテック】 生後32週まで 【ロタリックス】 生後24週まで	【初回】生後6週～生後14週6日まで 【2・3回目】前日より27日以上上げる	★2種類のワクチンがあります。 ロタテック(5価) 初回接種から27日以上あけて2回目、その後27日以降に3回目 ロタリックス(1価) 初回接種から27日以上あけて2回目接種		★令和2年10月～新たに定期予防接種に加わりました。 ★ロタテックの接種は、生後32週(約7か月半)まで ★ロタリックスの接種は、生後24週(約5か月半)まで
B型肝炎	1歳の前日まで	2～9か月	27日以上の間隔をおいて2回 1回目の接種から139日(5か月)以上おいて1回		★平成28年10月～新たに定期予防接種に加わりました。
ヒブ (インフルエンザ菌b型)	2か月～5歳の前日まで	2～6か月で開始	2～6か月で開始	初回 1歳の前日までの間に、27日(医師が必要と認める時は20日)以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回 追加 初回接種終了後、7か月以上、標準的には13か月までの間隔をおいて1回(※注1)	★接種を開始する月齢をに確認し、接種回数が増えたり減ったりします。接種回数が増えたり減ったりします。接種回数が増えたり減ったりします。
			7～11か月で開始	初回 1歳の前日までの間に、27日(医師が必要と認める時は20日)以上、標準的には56日までの間隔をおいて2回 追加 初回接種終了後、7か月以上、標準的には13か月までの間隔をおいて1回(※注2)	
			1～4歳で開始	1回	
小児用肺炎球菌 ハクニハンス(15価) プレペナー(20価)	2か月～5歳の前日まで	2～6か月で開始	2～6か月で開始	初回 標準的には1歳までの間に27日以上の間隔をおいて3回 追加 1歳から1歳3か月を標準的な接種期間として、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1歳以降に1回(※注3)	(※注1) 初回2回目及び3回目の接種は、1歳の前日までにすることし、それを越えた場合は行わないこと。この場合も追加接種は可能であるが、初回接種に係る最後の注射終了後、27日(医師が必要と認める場合は20日)以上の間隔をおいて1回行うこと。 (※注2) 初回2回目の接種は、1歳の前日までにすることし、それを越えた場合は行わないこと。この場合も追加接種は可能であるが、初回接種に係る最後の注射終了後、27日(医師が必要と認める場合は20日)以上の間隔をおいて1回行うこと。 (※注3) 初回2回目及び3回目の接種は2歳の前日までにすることし、それを越えた場合は行わないこと(追加接種は実施可能)。また初回2回目の接種は1歳を超えた場合、初回3回目の接種は行わないこと(追加接種は実施可能)。 (※注4) 初回2回目の接種は2歳の前日までにすることし、それを越えた場合は行わないこと(追加接種は実施可能)。
			7～11か月で開始	初回 標準的には1歳1か月までに27日以上の間隔をおいて2回 追加 初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、1歳以降に1回(※注4)	
			1～2歳で開始	60日以上の間隔をおいて2回	
			2～4歳で開始	1回	
5種混合 (ジフテリア・百日咳 破傷風・ポリオ・Hib)	2か月～ 7歳6か月の前日まで	【1期初回】 2～12か月	1期初回	20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回	★令和6年4月～新たに定期予防接種に加わりました。 ★4種混合、Hibを完了しているお子さんは、5種混合接種の必要はありません。
		【1期追加】初回接種 終了後12～18か月	1期追加	1期初回接種終了後、6か月以上、標準的には12か月から18か月の間隔をおいて1回	
4種混合 (ジフテリア・百日咳 破傷風・ポリオ)	2か月～ 7歳6か月の前日まで	【1期初回】 2～12か月	1期初回	20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回	★3種混合、ポリオを完了しているお子さんは、4種混合接種の必要はありません。
		【1期追加】初回接種 終了後12～18か月	1期追加	1期初回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて1回	
2種混合 (ジフテリア 破傷風)	11～13歳の前日まで	小学校6年生 に相当する年齢	2期	1回	★幼少期の3種または4種混合の追加接種です。
BCG	1歳の前日まで	5～8か月		1回	
麻しん・風しん 混合ワクチン (MR)	1歳～2歳の前日まで		1期	1回	
	小学校入学前の1年間		2期	1回	
水痘	1歳～3歳の前日まで	【初回】 1歳～1歳3か月	初回	1回	
		【追加】初回接種終了 後6～12か月	追加	初回接種終了後3か月以上、標準的には6～12ヶ月の間隔をおいて1回	
日本脳炎	6か月～ 7歳6か月の前日まで	【1期初回】3歳 【1期追加】4歳	1期初回 1期追加	6日以上標準的には28日までの間隔をおいて2回 1期初回接種終了後、6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいて1回	特例措置 【平成7年4月2日～平成19年4月2日生の方】 1期(3回)・2期(1回)を完了していない場合は、20歳の前々日までに不足回数分を接種。
	9歳～13歳の前日まで	小学校4年生 に相当する年齢	2期	1回	
子宮頸がん 予防ワクチン(HPV)	小学校6年生～高校1 年生の年齢に相当する 女子	中学校1年生 に相当する年齢	★3種類のワクチンがあります。途中で種類を変更することはできません。 サーバリックス(2価) 初回接種から1か月後に2回目、2回目接種5か月後に3回目 ガーダシル(4価) 初回接種から2か月後に2回目、2回目接種4か月後に3回目 シルガード(9価) 初回接種から6か月後に2回目(初回接種が15歳未満であれば2回の接種で完了)		経過措置(令和8年3月末まで) 【平成9年4月2日～平成21年4月1日生の女子】 令和7年3月までに1回以上接種をしている場合に限り、残りの回数分の接種をR8年3月末まで認める。

定期対象外予防接種(任意)

●麻しん風しん混合(MR)

対象者
1期 2歳～小学校入学前の1年間に相当する日の前日(3月31日)まで
2期 小学校1年生に相当する年の3月31日まで

★ただし、1期・2期ともに定期接種の対象時期に、医学的理由により接種ができなかった者に限る。
★接種前に保護者の申請手続きが必要。(接種費用は公費負担)
★健康被害等の問題が生じた場合は、鏡野町予防接種事故災害補償制度で対応。

インフルエンザ(任意)予防接種
令和7年10月～令和8年1月

鏡野町では、6か月～中学3年生に相当する年齢の方を対象に、インフルエンザ(任意)予防接種の費用を助成しています。

★町外の医療機関で接種する場合は、接種後に払い戻し申請が必要です。上限額あり。
※詳しくは、鏡野町ホームページをご確認ください。

◆問い合わせ先◆

鏡野町 健康推進課

電話
(0868)
54-2025

FAX
(0868)
54-2891